



FICHE DE BONNES PRATIQUES

Équipement d'utilisation individuelle :

- ✓ **Masque de protection** conforme à la norme européenne EN149 (type FFP2)
- ✓ Des **gants**
- ✓ Des **lunettes de protection**

Points clés pour une efficacité optimale du traitement

- ✓ Afin de maximiser l'efficacité du traitement, il est recommandé d'utiliser Api-Bioxal® **en période hivernale**, lors de la **rupture naturelle du couvain**.
- ✓ Au printemps ou en été, la rupture de ponte de la reine peut être obtenue par **encagement** de celle-ci afin de mettre la colonie dans une **situation hors couvain** propice à l'application d'Api-Bioxal®.
- ✓ Ne pas traiter les ruches **avec des hausses en place** ou **pendant la miellée** destinée à la consommation humaine.
- ✓ Toutes les colonies d'un même rucher **doivent être traitées simultanément** afin d'éviter toute réinfestation.

Durée de conservation :



La durée de conservation d'Api-Bioxal® dans son sachet d'origine est de **3 ans après fabrication**.



Une fois le **sachet ouvert**, vous pouvez le conserver **3 mois** à l'abri de la lumière et de l'humidité.



Une fois la **poudre mélangée** avec du sirop, le mélange peut être conservé pendant **24 heures**.¹

Posologie :

Méthode par dégouttement :

Deux traitements maximum par an sont autorisés (hiver et/ou printemps/été), uniquement en l'absence de couvain ou lorsque celui-ci atteint son niveau le plus bas.

Méthode par sublimation :


Un traitement maximum par an est autorisé (hiver et/ou printemps/été), uniquement en l'absence de couvain ou lorsque celui-ci est à son niveau le plus bas.

Une question à propos d'Api-Bioxal ?

Notre responsable technique peut répondre à vos questions : info@vetopharma.com

Comment l'appliquer par dégouttement :


- ✓ Verser toute la poudre du sachet dans la quantité indiquée de sirop.
- ✓ Mélanger jusqu'à dissolution.
- ✓ À l'aide d'une seringue, appliquez **5 ml** de solution par inter-cadre occupé. **La dose maximale autorisée est de 50 ml par ruche par application.**
- ✓ Après application, **se laver les mains et la peau** ayant été en contact avec le médicament vétérinaire avec du savon et de l'eau.



Format	Quantité de sirop	Recette sirop	Nombre approximatif de traitements
Sachet 31 g	Dissoudre dans 500 mL de sirop	308 mL d'eau + 308 g de sucre	10 ruches
Sachet 156 g	Dissoudre dans 2,5 L de sirop	1 540 mL d'eau + 1 540 g de sucre	50 ruches
Sachet 312 g	Dissoudre dans 5,0 L de sirop	3 080 mL d'eau + 3 080 g de sucre	100 ruches

Comment l'appliquer par sublimation :

- ✓ Utilisez un appareil à résistance électrique pour sublimation.
- ✓ Remplissez le bac du vaporisateur avec **2 g de produit**. **La dose maximale autorisée est de 2 g par ruche par application.**
- ✓ Allumez le vaporisateur en suivant les instructions du fabricant.
- ✓ La méthode par sublimation permet de traiter respectivement environ **15, 75 et 150 ruches**.
- ✓ Maintenir la ruche bien fermée pendant encore **15 minutes** après le traitement afin d'éviter la fuite des abeilles et de la fumée.
- ✓ Après application, **se laver les mains et la peau** ayant été en contact avec le médicament vétérinaire avec du savon et de l'eau.



Ne pas jeter sur la voie publique



✉ INFO@VETOPHARMA.COM

🌐 WWW.VETO-PHARMA.FR

Distribué par :

Véto-pharma
Bee Science

1- Si le mélange a été réalisé conformément aux instructions (cf. 3.9 du RCP Api-Bioxal poudre).

API-BIOXAL® 0,71 G/G POUDRE POUR RUCHE. Indication : Traitement de la varroase causée par *Varroa destructor* chez les abeilles (*Apis mellifera*). **Contre-indications** : Aucune. **Temps d'attente** : Miel : zéro jour. Ne pas traiter les ruches avec les hausses en position ou pendant la récolte du miel. **Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux** : Le médicament vétérinaire peut être irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires ou provoquer une dermatite de contact. Éviter le contact avec la peau, les yeux, les muqueuses et l'inhalation. Un équipement de protection individuelle consistant en un masque de protection conforme à la norme européenne EN149 (type FFP2), de gants et de lunettes de protection doit être porté lors de la manipulation du médicament vétérinaire (à la fois pendant les phases de vaporisation et de prétraitement). Après application, se laver les mains et la peau ayant été en contact avec le médicament vétérinaire avec du savon et de l'eau. Lavez soigneusement tous les vêtements qui entrent en contact avec le médicament vétérinaire. En cas de contact avec les yeux, les rincer à grande eau et consulter un médecin. Ne pas inhaler. En cas d'inhalation accidentelle, respirer de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin et montrer lui l'étiquette du produit. En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissement mais consulter un médecin et montrer lui ces précautions. Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation du médicament vétérinaire. v0126FR-gp.

Api-bioxal est un médicament vétérinaire. Demandez conseil à votre vétérinaire ou pharmacien. En cas de persistance des symptômes, consultez votre vétérinaire. AP2026/4981

ABX15-FR-N01-02/26