

ApiLifeVar

Distribué par Vêto-pharma

FICHE PRATIQUE D'UTILISATION



NOS RECOMMANDATIONS

Pour garantir l'efficacité du traitement et préserver le bon équilibre de la colonie :

- ✓ Ne pas traiter en présence de hausses ou pendant une miellée
- ✓ Ne pas traiter lors de fortes chaleurs supérieures à 30°C (provoque stress et mortalité des abeilles adultes et du couvain). Ne pas placer les morceaux directement au centre de la ruche ou au contact du couvain : ils doivent être placés aux 4 coins de la ruche.
- ✓ Ne pas traiter lorsque la température extérieure est inférieure à 15°C (efficacité réduite)
- ✓ L'utilisation du produit n'est pas recommandée dans les ruches à plusieurs corps car son efficacité peut ne pas être satisfaisante.

COMMENT APPLIQUER SON TRAITEMENT

Manipuler le sachet **avec précaution afin d'éviter de casser les plaquettes**. Pour une ouverture propre et sécurisée, privilégier l'utilisation de ciseaux ou d'un cutter




Étape 1

Ouvrir le sachet à l'aide de vos ciseaux ou d'un cutter.



Étape 2

Prendre l'une des deux plaquettes et la diviser en 4 morceaux.



Étape 3

Ouvrir la ruche puis répartir les morceaux aux 4 coins de la ruche, sur le dessus des cadres (évitiez de les poser dans la zone de couvain).



Étape 4

Fermer la ruche et laisser le traitement agir pendant 7 jours. Répéter le traitement au total 4 fois avec une nouvelle plaquette à chaque passage.

Sur toute la durée du traitement, **deux sachets d'ApiLife Var®** sont nécessaires pour traiter une ruche (soit 4 plaquettes).

QUAND TRAITER

ApiLife Var® peut être utilisé :

- ☀ À la fin de l'été, après la récolte du miel, quand le nombre d'abeilles dans le couvain diminue.

Pour une efficacité optimale :

- ✓ Température idéale : entre 20°C et 25°C
- ✖ Éviter les températures inférieures à 15°C
- ✖ Ne pas traiter au-dessus de 30°C.

Pour favoriser une diffusion progressive des principes actifs :



Appliquer tôt le matin



ou En fin d'après-midi.



NOS CONSEILS AU RUCHER

- ✓ Traiter l'ensemble des ruches simultanément afin de limiter les risques de pillage et de ré-infestation.
- ✓ Réaliser des comptages avant et après traitement pour suivre la pression parasitaire.
- ✓ Retirer les résidus de traitement à la fin de la période recommandée.
- ✓ Éviter les perturbations excessives de la colonie pendant le traitement.
- ✓ Retirer temporairement les entrées de ruche si nécessaire selon les conditions du rucher.
- ✓ Les abeilles peuvent avoir tendance à déplacer les morceaux et les propoliser. C'est un comportement normal.

BONNES PRATIQUES DE CONSERVATION

Pour préserver les propriétés du produit :

- ✓ Conserver ApiLife Var® à une température **inférieure à 25 °C**.
- ✓ Conserver les plaquettes non ouvertes dans leur **emballage d'origine**.
- ✓ Stocker le produit **à l'abri de la lumière** directe du soleil.
- ✓ **A conserver à l'abri du gel.**
- ✓ **Ne pas conserver au réfrigérateur, ne pas congeler.**



BONNES PRATIQUES D'UTILISATION

Il est recommandé de porter des **gants imperméables** et un **équipement de protection individuelle approprié** lors de la manipulation du produit. Après utilisation, **se laver les mains et laver le matériel** en contact avec les plaquettes avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec la peau, laver simplement avec de l'eau et du savon.

 **Visitez notre page web pour plus d'informations et de ressources supplémentaires !**

APILIFE VAR RUBAN POUR RUCHE POUR ABEILLES. Indication : (*Apis mellifera*) : Traitement de la varroase chez les abeilles due à *Varroa destructor*. **Contre-indications :** Ne pas traiter pendant la miellée afin de ne pas altérer le goût du miel. Ne pas utiliser lorsque la température est supérieure à 30°C. **Temps d'attente :** Miel : Zéro jour. Ne pas traiter pendant la miellée afin de ne pas altérer le goût du miel. **Lire attentivement les instructions figurant sur la notice du produit avant utilisation. Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :** Les personnes présentant une hypersensibilité connue au thymol doivent administrer le médicament vétérinaire avec précaution. Ce médicament vétérinaire peut provoquer une irritation de la peau et des yeux, il convient donc d'éviter tout contact direct avec la peau et les yeux. Un équipement de protection individuelle consistant en gants imperméables et un équipement de protection habituel doit être porté lors de la manipulation du médicament vétérinaire. Après l'utilisation, se laver les mains et laver le matériel en contact avec le ruban avec de l'eau et du savon. En cas de contact cutané accidentel, lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon. En cas de contact accidentel avec les yeux, lavez soigneusement et abondamment avec de l'eau claire, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette. Ne pas inhaler.

Ce médicament est un médicament vétérinaire. Demandez conseil à votre vétérinaire ou pharmacien. En cas de persistance des symptômes, consultez votre vétérinaire. V0626FR-gp.
AP 2026/5156

